

ՄԻԱՄՆԱԿԱՆ ՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ

2013

ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ

ԹԵՍՏ 2

Խմբի համարը

Նստարանի համարը

Հարգելի՛ դիմորդ

Առաջադրանքները կատարելիս յուրաքանչյուրից պետք է ընտրել այն տարբերակը, որը Ձեր կարծիքով ճիշտ պատասխանն է, և պատասխանների ձևաթղթի համապատասխան մասում կատարել նշում:

Խորհուրդ ենք տալիս առաջադրանքները կատարել ըստ հերթականության: Ուշադիր կարդացե՛ք յուրաքանչյուր առաջադրանքի պահանջը և պատասխանների առաջարկվող տարբերակները: Եթե Ձեզ չի հաջողվում որևէ առաջադրանքի անմիջապես պատասխանել, ժամանակը խնայելու նպատակով կարող եք այն բաց թողնել և դրան անդրադառնալ ավելի ուշ:

Ձեր առջև դրված թեստ-գրքույկի էջերի դատարկ մասերը ազատորեն կարող եք օգտագործել սևագրության համար: **Թեստ-գրքույկը չի ստուգվում: Ստուգվում է միայն պատասխանների ձևաթուղթը:**

Առաջադրանքները կատարելուց հետո չմոռանաք պատասխանները ուշադիր և խնամքով նշել պատասխանների ձևաթղթում: Պատասխանների ձևաթղթի ճիշտ լրացումից է կախված Ձեր քննական միավորի ճշտությունը:

Ցանկանում ենք հաջողություն:

Ա մակարդակ

I. Տրված են 12 և 32 թվերը:

1

Գտնել այդ թվերից մեծի և փոքրի տարբերության հակադիր թիվը:

- 1) -19
- 2) -44
- 3) 20
- 4) -20

2

Գտնել այդ թվերի գումարը 5-ի բաժանելիս ստացված մնացորդը:

- 1) -1
- 2) 1
- 3) 4
- 4) 0

3

Գտնել այդ թվերի ամենամեծ ընդհանուր բաժանարարը:

- 1) 4
- 2) 96
- 3) 6
- 4) 3

4

Գտնել այդ թվերի ամենափոքր ընդհանուր բազմապատիկը:

- 1) 384
- 2) 4
- 3) 96
- 4) 144

II Գտնել արտահայտության արժեքը.

5) $\frac{2^{15}}{4^8}:$

- 1) $\frac{1}{4}$
- 2) 4
- 3) $\frac{1}{2}$
- 4) 2

6) $(6 - \sqrt{35}) \cdot \frac{\sqrt{7} + \sqrt{5}}{\sqrt{7} - \sqrt{5}}:$

- 1) $6 + \sqrt{35}$
- 2) 1
- 3) 6
- 4) $\sqrt{6}$

7) $\sin 390^\circ + \operatorname{tg} 60^\circ \cdot \operatorname{ctg} 60^\circ:$

- 1) $\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{3}$
- 2) $\frac{\sqrt{3}}{2} + 1$
- 3) 2
- 4) 1,5

8) $\frac{\log_1 27}{\log_2 3 \cdot \log_3 8}:$

- 1) -1
- 2) $\log_2 27$
- 3) 1
- 4) $\log_{\frac{1}{3}} 8$

III. Լուծել հավասարումը.

9 $2x(x-1)=3(x-1):$

- 1) 1,5
- 2) 1
- 3) 1 և 3,5
- 4) 1 և 1,5

10 $\sqrt{3x-9}=2:$

- 1) արմատ չունի
- 2) 13
- 3) 4
- 4) $\frac{13}{3}$

11 $\log_5(5-3x)=2:$

- 1) $\frac{22}{3}$
- 2) -6,66
- 3) $\frac{20}{3}$
- 4) $-\frac{20}{3}$

12 $2(\cos x-1)=0:$

- 1) $\pm\frac{\pi}{4}+\pi n, n \in Z$
- 2) $2\pi k, k \in Z$
- 3) $\pi+\pi k, k \in Z$
- 4) $\pi+2\pi k, k \in Z$

IV. Լուծել անհավասարումը.

13 $\frac{7}{3} + 2x > \frac{9x}{4}$:

1) $\left(-\infty; -\frac{28}{3}\right)$

2) $\left(\frac{28}{3}; +\infty\right)$

3) $\left(-\frac{28}{3}; +\infty\right)$

4) $\left(-\infty; \frac{28}{3}\right)$

14 $3x^2 < x + 4$:

1) $(-\infty; -1) \cup \left(\frac{4}{3}; +\infty\right)$

2) $\left(-1; \frac{4}{3}\right)$

3) $(-\infty; -\frac{4}{3}) \cup (1; +\infty)$

4) $\left(-\frac{4}{3}; 1\right)$

15 $\sqrt{x-2} < 2$:

1) $(5; +\infty)$

2) $(-\infty; 6)$

3) $[2; 6)$

4) $[2; +\infty)$

16 $\log_2(x-5) \leq 3$:

1) $(-\infty; 8]$

2) $(-\infty; -13]$

3) $(5; 13]$

4) $[5; +\infty)$

V. Գետի հոսանքի ուղղությամբ 120 կմ ճանապարհը նավակն անցնում է 4 ժամում, իսկ հակառակ ուղղությամբ՝ 132 կմ ճանապարհը 6 ժամում:

17 Լաստը քանի՞ ժամում կարող է անցնել 28 կմ ճանապարհը:

- 1) 7
- 2) 6
- 3) 8
- 4) 11

18 Կանգնած ջրում նավակը քանի՞ ժամում կարող է անցնել 78 կմ ճանապարհը:

- 1) 5
- 2) 2, 5
- 3) 3
- 4) 6

19 Գետի հոսանքի հակառակ ուղղությամբ նավակը 5 ժամում քանի՞ կմ կարող է անցնել:

- 1) 130
- 2) 110
- 3) 150
- 4) 120

20 Եթե նավակը և լաստը միաժամանակ A վայրից շարժվեն հակառակ ուղղություններով, քանի՞ ժամ հետո նրանց հեռավորությունը կլինի 65 կմ:

- 1) 3,5
- 2) 2
- 3) 2,5
- 4) 3

VI. Տրված են $p(x) = x^4 - 5x^2 + 2$ և $q(x) = x - 2$ բազմանդամները:

21 Ձ-տնել $p(x)$ բազմանդամի արմատների քանակը:
1) 1
2) 2
3) 3
4) 4

22 Ձ-տնել $p(x)$ բազմանդամի արմատների միջին թվաբանականը:
1) 5
2) 0
3) -5
4) 2

23 Ձ-տնել $p(x) \cdot (q(x))^2$ բազմանդամի աստիճանը:
1) 8
2) 6
3) 5
4) 7

24 Ձ-տնել $p(x)$ -ը $q(x)$ -ի բաժանելիս ստացվող մնացորդը:
1) -2
2) 38
3) 2
4) 4

VII. Տրված են $ABCD$ ուղղանկյան երեք գագաթները՝
 $B(-2;4)$, $C(3;4)$, $D(3;-2)$:

25 Ք-տնել A գագաթի կոորդինատները:

- 1) $(2;3)$
- 2) $(-2;-2)$
- 3) $(4;-3)$
- 4) $(2;-2)$

26 Ք-տնել \overline{AB} և \overline{DB} վեկտորների սկալյար արտադրյալը:

- 1) 30
- 2) -30
- 3) 36
- 4) -36

27 Ք-տնել $ABCD$ ուղղանկյան մակերեսը:

- 1) 36
- 2) 30
- 3) 25
- 4) 40

28 Ք-տնել $\overline{AC} - 2\overline{AD}$ վեկտորի կոորդինատները:

- 1) $\{-5;6\}$
- 2) $\{6;5\}$
- 3) $\{5;-6\}$
- 4) $\{-5;-6\}$

VIII. Տրված է $f(x) = x + \ln(-x)$ ֆունկցիան:

29 Գտնել f ֆունկցիայի որոշման տիրույթը:

- 1) $(-\infty; +\infty)$
- 2) $(0; +\infty)$
- 3) $(-\infty; 0)$
- 4) $(-\infty; 0]$

30 Գտնել f ֆունկցիայի կրիտիկական կետերը:

- 1) 1
- 2) -1
- 3) 0 և 1
- 4) 1 և -1

31 Գտնել ֆունկցիայի աճման միջակայքը:

- 1) $[-1; +\infty)$
- 2) $(-\infty; 0)$
- 3) $(-\infty; -1]$
- 4) $[-1; 0)$

32 Գտնել ֆունկցիայի մեծագույն արժեքը $[-4; -0,5]$ հատվածում:

- 1) 1
- 2) $-0,5 - \ln 0,5$
- 3) $-4 + \ln 4$
- 4) -1

IX. Գլանի հիմքի շառավիղը հավասար է 6, իսկ կողմնային մակերևույթի մակերեսը 4 անգամ մեծ է հիմքի մակերեսից:

33 Գտնել գլանի բարձրության երկարությունը:

- 1) 12
- 2) 8
- 3) 4
- 4) 2

34 Հաշվել գլանի լրիվ մակերևույթի մակերեսը:

- 1) 216π
- 2) 144π
- 3) 216
- 4) 72π

35 Գտնել գլանի ծավալը:

- 1) 432
- 2) 144π
- 3) 432π
- 4) 648

36 Գտնել գլանի առանցքային հատույթի անկյունագծի և հիմքի հարթության կազմած անկյան աստիճանային չափը:

- 1) 60
- 2) 45
- 3) 90
- 4) 30

X. ABC եռանկյանը ներգծված է 6 շառավիղով շրջանագիծ, որն AB , BC և AC կողմերը շոշափում է համապատասխանաբար M , N և K կետերում: Եռանկյան մակերեսը 204 է, իսկ AB փոքր կողմը հավասար է CK -ին:

37 Գտնել եռանկյան կիսապարագիծը:

38 Գտնել եռանկյան փոքր կողմի երկարությունը:

39 Գտնել AM և MB հատվածներից մեծի երկարությունը:

40 Գտնել եռանկյան մեծ կողմի երկարությունը:

XI. Տրված է $\sqrt{x+6} + \sqrt{10-x} = 4$ հավասարումը:

41 Քանի՞ ամբողջ թիվ է պարունակում հավասարման թՎԲ-ը:

42 Գտնել հավասարման ամենամեծ արմատը:

43 Քանի՞ արմատ ունի հավասարումը:

44 Գտնել հավասարման ձախ մասի արտահայտության արժեքների բազմությանը պատկանող ամենամեծ ամբողջ թիվը:

XII. (a_n) -ը 5 տարբերությունով թվաբանական պրոգրեսիա է, իսկ (x_n) -ը՝ դրական անդամներով և 2 հայտարարով երկրաչափական պրոգրեսիա:

45 $b_n = a_{2n}$ հաջորդականությունը 10 տարբերությունով թվաբանական պրոգրեսիա է:

46 $c_n = \frac{a_n + 1}{2}$ հաջորդականությունը 3 տարբերությունով թվաբանական պրոգրեսիա է:

47 $y_n = x_{5n}$ հաջորդականությունը 10 հայտարարով երկրաչափական պրոգրեսիա է:

48 $z_n = x_n^3$ հաջորդականությունը 8 հայտարարով երկրաչափական պրոգրեսիա է:

49 $y_n = 2^{a_n}$ հաջորդականությունը 25 հայտարարով երկրաչափական պրոգրեսիա է:

50 $b_n = \log_4 x_n$ հաջորդականությունը $\frac{1}{2}$ տարբերությունով թվաբանական պրոգրեսիա է:

Բ մակարդակ

XIII. Երկու ծորակների համատեղ գործելու դեպքում ջրավազանը լցվում է 15 ժամում: Մեկ ժամում առաջին ծորակից հոսում է 20%-ով պակաս ջուր, քան երկրորդից:

51 Մեկ ժամում երկրորդ ծորակից քանի՞ տոկոսով է ավելի ջուր հոսում, քան առաջինից:

52 Միայն երկրորդ ծորակը քանի՞ ժամում կարող է լցնել ջրավազանը:

53 Առաջին ծորակով քանի՞ ժամում կարող է լցվել այդպիսի չորս ջրավազան:

54 Քանի՞ ժամում կարող է լցվել ջրավազանը, եթե 5 ժամ գործի միայն առաջին ծորակը, իսկ մնացած մասը լցվի միայն երկրորդ ծորակով:

XIV. Տրված է $f(x) = \sqrt{3-x} + x^2 - 6x + 16$ ֆունկցիան:

55 Գտնել f ֆունկցիայի որոշման տիրույթի ամենամեծ թիվը:

56 Գտնել f ֆունկցիայի ամենափոքր արժեքը:

57 Գտնել f ֆունկցիայի ամենամեծ արժեքը $[-1; 2]$ միջակայքում:

58 Քանի՞ անբողջ արժեք է ընդունում f ֆունկցիան $[-1; 3]$ միջակայքում:

XV. Տրված է $\begin{cases} x^2 - 4x + 3 = 0 \\ 2x + 5 \geq a \end{cases}$ համակարգը:

59 Գտնել այն ամենափոքր a ամբողջ թիվը, որի դեպքում համակարգը լուծում չունի:

60 Գտնել այն բոլոր a ամբողջ թվերի քանակը, որոնց դեպքում համակարգը կունենա միակ լուծում:

61 Գտնել այն ամենամեծ a ամբողջ թիվը, որի դեպքում համակարգն ունի ճիշտ երկու լուծում:

62 Գտնել այն ամենամեծ a ամբողջ թիվը, որի դեպքում համակարգն ունի լուծում:

XVI. Բուրգի հիմքը 12 երկարությամբ կողմով և 6 բարձրությամբ շեղանկյուն է: Բուրգի բարձրությունը 3 է: Բուրգի հիմքին առընթեր բոլոր երկնիստ անկյունները հավասար են:

63 Գտնել բուրգի ծավալը:

64 Գտնել բուրգի հիմքին առընթեր երկնիստ անկյան աստիճանային չափը:

65 Գտնել բուրգի հանդիպակաց կողմնային նիստերի կազմած անկյան աստիճանային չափը:

66 Գտնել բուրգի բարձրությունով անցնող և կողմնային նիստին ուղղահայաց հատույթի մակերեսը:

XVII. Կատարել առաջադրանքները.

67 Քանի՞ քառանիշ թիվ կարելի է կազմել միայն կենտ թվանշաններով:

68 Չկրկնվող թվանշաններով քանի՞ եռանիշ թիվ կարելի է կազմել՝ չօգտագործելով 8, 9 թվանշաններից ո՛չ մեկը:

XVIII. $ABCD$ գուգահեռագծի ($AB \neq BC$) AD կողմի միջնակետը M կետն է, իսկ BC կողմի միջնակետը՝ N կետը: AN և CM ուղիղները գուգահեռագծի BD անկյունագիծը հատում են համապատասխանաբար P և Q կետերում:

69 $BP < PQ$:

70 $APCQ$ -ն գուգահեռագիծ է:

71 P -ն ABC եռանկյանը արտագծած շրջանագծի կենտրոնն է:

72 $CQ = 2 \cdot QM$:

73 APQ և CQD եռանկյունները հավասարամեծ են:

74 $ABCD$ գուգահեռագծի մակերեսը 6 անգամ մեծ է PMD եռանկյան մակերեսից:

XIX. Տրված է $f(x) = |\cos x| - \cos^2 x$ ֆունկցիան:

75 Ֆունկցիան զույգ է:

76 Ֆունկցիան 2π -պարբերական է:

77 Ֆունկցիան փոքրագույն արժեք չունի:

78 Ֆունկցիան ընդունում է միայն ոչդրական արժեքներ:

79 Ֆունկցիայի գրաֆիկն արագիսների առանցքը $[0; 2\pi]$ հատվածը հատում է ճիշտ հինգ կետում:

80 Ֆունկցիան $\left[\frac{3\pi}{4}; \frac{5\pi}{3}\right)$ միջակայքում ունի ճիշտ երեք կրիտիկական կետ: